

වී වගාවේ පොහොර නිර්දේශය
බස්නාහිර පළාත

මාස 4-4½

	වර්ෂා පෝෂිත (Kg/Ac)			වාරි පෝෂිත(Kg/Ac)		
	Urea	TSP	MOP	Urea	TSP	MOP
මූලික		22			14	
සති 03	10		14	8		
සති 06	12		18	22		10
සති 08	10		12	18		10
සති 09	8			8		
එකතුව	40	22	44	56	14	20

මාස 3½

	වර්ෂා පෝෂිත (Kg/Ac)			වාරි පෝෂිත(Kg/Ac)		
	Urea	TSP	MOP	Urea	TSP	MOP
මූලික		22			14	
සති 03	10		14	8		
සති 05	12		18	22		10
සති 07	10		12	18		10
සති 08	8			8		
එකතුව	40	22	44	56	14	20

මාස 03

	වර්ෂා පෝෂිත (Kg/Ac)			වාරි පෝෂිත(Kg/Ac)		
	Urea	TSP	MOP	Urea	TSP	MOP
මූලික		22			14	
සති 02	10		14	8		
සති 04	12		18	22		10
සති 06	10		12	18		10
සති 07	8			8		
එකතුව	40	22	44	56	14	20

මාස 2½

	වර්ෂා පෝෂිත (Kg/Ac)			වාරි පෝෂිත(Kg/Ac)		
	Urea	TSP	MOP	Urea	TSP	MOP
මූලික		22			14	
දින 10	10		14	8		
දින 25	12		18	22		10
දින 35	10		12	18		10
දින 42	8			8		
එකතුව	40	22	44	56	14	20

පාංශු pH අගය පරීක්ෂාකර ඩොලමයිට් පොහොර පලමු බිම් සැකසීමට පෙර කුඹුරට යොදන්න
මහ කන්නය සඳහා අක්කරයට සින්ක් සල්ෆේට් කි.ග්‍රෑ.02 මූලික පොහොර සමග යොදන්න
පත්‍රවර්ණ දර්ශකය අගය අනුව යූරියා පොහොර යොදන්න

#ricegampaha